



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

*федеральное государственное бюджетное учреждение
государственный центр агрохимической службы «Ростовский»
(ФГБУ ГЦАС «Ростовский»)*

*346735, Ростовская обл., Аксайский район, п. Рассвет, ул. Институтская д.2,
тел.: (886350) 37-7-05, факс: (886350) 37-1-29, e-mail: agrohim_61_1@mail.ru*

Информационный листок

На вторую декаду марта в районах Приазовской, Центральной орошаемой и Южной зонах озимая пшеница, в основном, в начале кущения; Северо-Западной, Северо-восточной и Восточной – в фазе кущения. В отдельных районах Северо-Восточной зоны отмечен выход в трубку.

Азотные подкормки проведены по мерзло-талой почве и, частично, по подсыхающей.

Дальнейшее проведение азотных подкормок прикорневым способом нецелесообразно в виду низкой влажности почвы.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское» УГМС на 18 марта запасы влаги в слое 0-20 см хорошие (> 20 мм) и удовлетворительные (17 – 20 мм).

В метровом слое недостаточные (92 - 120 мм), удовлетворительные (120 - 132), и хорошие (151 – 160 мм). На отдельных полях отличные (162 – 179 мм) и плохие 74 мм.

Особенно низкие запасы влаги в Северо-Западной зоне, в Сальском районе Южной зоны и в Азовском районе Приазовской зоны.

За вторую декаду марта, в среднем по области, сумма осадков составила 10% от нормы. Наибольшее количество (40 и 78%) их выпало в отдельных районах Северо-Западной зоны.

В целом, по области за период ноябрь 2019 – март 2020 года количество осадков составило 83% от нормы.

Кроме недостаточного количества осадков, выпавших во второй декаде марта, в большинстве районов наблюдался сильный ветер, иссушающий верхний 5 см слой почвы. В таких условиях аммиачная селитра, внесенная сеялкой на глубину 3 – 4 см, не будет использована растениями.

В дальнейшем, нарастание температур будет способствовать усилению вегетации озимой пшеницы. Поэтому, необходимо дожидаться устойчивых положительных температур и провести азотную подкормку не корневым способом, используя КАС и карбамид, по результатам листовой диагностики. Листовая диагностика обязательна, т.к. в противном случае можно спровоцировать активное и нежелательное нарастание вегетативной массы.

В отдельных районах Северо-Восточной, Восточной и Южной зон, где наблюдался ветер со скоростью при порывах 15-18 м/сек. и позволяет высота растений, провести закрытие влаги боронованием.